

JOURNAL DE TRANSMISSIONS
des consignes et remarques des soignants : médecin et infirmier(e)

NOM et prénom du patient :

Nom du médecin traitant :

Coordonnées :.....

Nom de l'infirmier :.....

Coordonnées :.....

Sur la grille ci-dessous : report du score de Cushman et du protocole thérapeutique avec adaptation éventuelle.

Le calcul du score de Cushman se fait sur la page suivante.

J	Cushman		Posologie médicamenteuse et adaptation éventuelle / Cushman (protocole)	Remarques
	Matin	Soir		
J 0				
J 1				
J 2				
J 3				

J	Cushman	Posologie médicamenteuse et adaptation éventuelle / Cushman (protocole)	Remarques
J 4			
J 5			
J 6			
J 7			
J 8			
J 9			
J 10			

Semaine	Remarques
S 1	
S 2	
S 3	
S 4	

SCORE DE CUSHMAN de J4 à J10

	0	1	2	3	Score J4	Score J5	Score J6	Score J7	Score J8	Score J9	Score J10
Pouls	< 80	80 - 100	101 - 120	> 120							
T.A. Systolique** (au-delà de 50 ans, rajouter 10mm de Hg)	< 135	136 - 145	146 - 155	> 155							
Fréquence respiratoire*	< 16	16 - 25	26 - 35	> 35							
Tremblements	0	De la main en extension	Tout le membre supérieur	Généralisés							
Sueurs* (Critères valables en l'absence de fièvre. T° <38°C)	0	Paumes	Paumes et front	Généralisées							
Agitation	0	Discrète	Généralisée mais contrôlable	Généralisée et incontrôlable							
Troubles sensoriels	0	Gêne provoquée par la lumière ou le bruit ; prurit	Hallucinations critiquées	Hallucinations non critiquées							
Total score											

* Critères valables en l'absence de fièvre (température <38°C)

** Critères valables entre 31 et 50 ans. Au-delà de 50 ans, ajouter 10mm de Hg

Protocole d'adaptation du traitement
en fonction
du score de Cushman

Score < 5 Syndrome de sevrage simple	Traitement dégressif selon ordonnance.
Score entre 5 et 7	<p>De J1 à J3 il est possible d'introduire une prise médicamenteuse de plus par jour : 4 comprimés de diazépam 10 au lieu de 3, ou 4 demis comprimés d'oxazépam 50 au lieu de 3 .</p> <p>Au-delà de J3, il est toujours possible de revenir à la posologie antérieure c'est-à-dire de réaugmenter le traitement d'une prise quotidienne par rapport à la prescription antérieure voire plus, jusqu'au maximum prévu dans ce protocole.</p> <p>Dans tous les cas il faut reprendre progressivement la dégressivité en fonction de l'évolution à la baisse du score de cushman. Ne pas hésiter à joindre l'infirmier coordinateur PSAAL si nécessaire.</p>
Score entre 7 et 10	Réévaluation médicale nécessaire (augmentation du traitement, réhydratation)
Score supérieur à 10	Hospitalisation nécessaire

Transmissions médecin → IDE domicile

<u>Consultations médicales (noter D pour domicile ou C pour cabinet) et noter le jour (date et correspondance avec le calendrier de sevrage ex :J3 ou J10)</u>	<u>Transmissions</u>